

Beiträge zur Kenntnis  
der  
Land- und Süßwasserfauna  
Deutsch-Südwestafrikas

Ergebnisse der  
Hamburger deutsch-südwestafrikanischen Studienreise 1911

Herausgegeben

von

W. Michaelsen (Hamburg).

---

Band I.

Mit 8 Tafeln und 1 Karte, sowie 7 Kartenskizzen  
und 58 Abbildungen im Text



HAMBURG  
L. FRIEDERICHSEN & CO.  
1914—1916.

## Inhaltsverzeichnis

des I. Bandes.

Herausgegeben 1914:

	Seite
Vorwort des Herausgebers . . . . .	1—4
W. MICHAELSEN (Hamburg), Reisebericht (mit 1 Karte und 15 Abbildungen im Text) . . . . .	5—53
K. KRAEPELIN (Hamburg), Bryozoa (mit 1 Tafel) . . . . .	55—69
Y. SJÖSTEDT (Stockholm), Isoptera (mit 1 Tafel und 2 Ab- bildungen im Text) . . . . .	71—92
C. VAN DOUWE (München), Copepoda (mit 1 Tafel und 1 Karten- skizze im Text) . . . . .	93—103
K. KRAEPELIN (Hamburg), Skorpiones und Solifugae (mit 6 Abbildungen im Text) . . . . .	105—136
W. MICHAELSEN (Hamburg), Oligochaeta (mit 1 Tafel, sowie 1 Abbildung und 6 Kartenskizzen im Text) . . . . .	137—182
Gy. SZÉPLIGETI (Budapest), Hymenoptera I: Braconidae . . . . .	183—191
G. ENDERLEIN (Stettin), Hymenoptera II: Archihymenidae (mit 1 Tafel und 1 Abbildung im Text) . . . . .	193—199
J. J. KIEFFER (Bitsch), Hymenoptera III: Serphidae (Proct- otropidae) . . . . .	201—207
G. ENDERLEIN (Stettin), Hymenoptera IV: Ichneumonidae (mit 6 Abbildungen im Text) . . . . .	209—233
N. ANNANDALE (Calcutta), Spongillidae (mit 1 Tafel) . . . . .	235—249
J. WEISE (Warmbrunn), Coleoptera I: Chrysomelidae und Coccinellidae . . . . .	251—275
H. BICKHARDT (Kassel), Coleoptera II: Histeridae . . . . .	277—282
M. PIC (Digoin), Coleoptera III: Malacodermata et Bruchidae . . . . .	283—288
P. LESNE (Asnières), Coleoptera IV: Lyetidae . . . . .	289—292
Ch. KERREMANS (Brüssel), Coleoptera V: Buprestidae . . . . .	293—303
J. MOSER (Berlin), Coleoptera VI: Cetonidae . . . . .	305—309

## Herausgegeben 1915:

	Seite
MAX BERNHAUER (Horn in Niederösterreich), Coleoptera VII: Staphylinidae . . . . .	311—321
FR. WERNER (Wien), Reptilia und Amphibia (mit 1 Tafel und 1 Abbildung im Text) . . . . .	323—376

## Herausgegeben 1916:

G. STEINER (Zürich-Thalwil), Nematodes (mit 26 Abbildungen im Text) . . . . .	377—411
H. FRIESE (Schwerin i. M.), Hymenoptera V: Apidae (mit 1 Tafel) . . . . .	413—452

---



Coleoptera III:  
Malacodermata et Bruchidae

par

Maurice Pic  
(Digoin).

Les espèces décrites ici proviennent du Sud-Ouest Africain Allemand et appartiennent au Musée de Hambourg; sauf *Bruchus Michaelseni* n. sp. qui est unique, elles figurent aussi dans ma collection. La variété est représentée par deux exemplaires.

---

## Malacodermata.

### *Lycus trabeatus* Guér.

**Habitat:** Klein-Windhuk; H. THOMSEN, III. 1913.

Sans indication de localité; Landesmuseum Windhuk.

### *Lycus subtrabeatus* Bong.

**Habitat:** Osire sur l'Omuramba-Omatoko; O. HENTSCHEL, I.—II. 1910.

Région septentrional du „Sandfeld“, entre Omuramba du Lion („Löwen-Omuramba“) et Owangowa-Veld; Bezirksamtmaun v. ZASTROW, 1912.

### *Attalus (Mixis) Michaelseni* n. sp.

Oblongus, postice dilatatus, mediocre pubescens, nitidus, testaceus, pro parte albidus, elytris signaturis nigris ornatis, scutello et infra corpore pro parte nigris.

**Habitat:** Oamaru; Dr. W. MICHAELSEN, 22. VI. 1911.

Oblong, un peu rétréci en arrière, modérément pubescent, brillant, testacé avec le pourtour postérieur du prothorax et une partie du milieu des élytres blanchâtres, tête un peu moins large que le prothorax, yeux noirs; prothorax court, un peu élargi vers le milieu, rebordé, parfois vaguement maculé de brun sur le disque; antennes pas très longues

et moyennes: élytres un peu plus larges que le prothorax, élargis après le milieu et rétrécis au sommet, subearénés sur les côtés au milieu, (chez le ♂ munis au sommet d'une épine recourbée), ornés d'un dessin noir médian formé d'une bande arquée vers la suture et d'un petit prolongement externe, noirs (parfois avec une petite macule de chaque côté de l'écusson), ponctuation assez fine, irrégulière; pattes assez grêles, testacées; dessous du corps noir avec l'abdomen plus ou moins testacé à l'extrémité; pygidium testacé. Long. 3 mill.

Voisin de *A. erquisitus* Ab., élytres plus brillants, à dessins noirs différents, autrement terminés au sommet chez ♂.

### *Apalochrus festivus* Er.

**Habitat:** Klein-Windhuk; H. THOMSEN, III. 1913 (♂, ♀).

### *Cantharis fumosa* Schnz. ?

**Habitat:** Ferme Otjituezu, 66 km NO de Windhuk; Dr. W. MICHAELSEN, V. 1911.

### *Falsomelyris Schulzi* n. sp.

Modice elongatus, fere opacus, luteo pubescens, niger, clytris pedibusque plus minusve testaceis.

**Habitat:** Windhuk.

Modérément allongé, presque mat, orné d'une pubescence jaune un peu dorée, très distincte et assez dense sur l'avant-corps, espacée sur les élytres, noir avec les élytres et les pattes plus ou moins testacés, d'ordinaire pattes testacées avec les genoux foncés, tête pas très longue, un peu moins large que le prothorax, yeux moyens; antennes noires à base parfois un peu roussâtre, à articles 4 et suivants très dentelés; prothorax assez court, rétréci en avant, marqué d'une trace de carène près des bords et antérieurement, sillonné sur le disque; écusson transversal; élytres bien plus larges que le prothorax, subparallèles, courtement rétrécis au sommet, rebordés, ornés chacun de trois côtes, en outre de la suture, relevées, intervalles avec trois ou quatre rangées de gros points subarrondis; pattes moyennes, variablement marquées de noir sur coloration générale testacée.

Long. 6—8 mill. Cette espèce, facile à reconnaître par sa coloration, peut prendre place près de *ruficolor* CUR.

*Melyris viridis* var. *subacuminatus* n. var.

Satis elongatus, nitidus, apice subacuminatus, viridis, pro parte subcoeruleus.

**Habitat:** Lüderitzbuch: Dr. W. MICHAELSEN, 5.—13. VII. 1911.

Assez allongé, très rétréci et subacuminé au sommet des élytres, vert avec des reflets bleutés par places, membres foncés. Long. 12 mill.

Principalement distincte par la forme plus allongée du corps et l'aspect plus brillant.

## Bruchidae.

*Bruchus Michaelseni* n. sp.

Oblongus, antice posticeque attenuatus, subopacus, sat dense albo aut luteo pubescens, testaceus, elytris pro parte subdenudatis, pro parte signaturis albidis ornatis.

**Habitat:** Okahandja: Dr. W. MICHAELSEN, 28. IV. 1911.

Oblong, rétréci aux deux extrémités, presque opaque, testacé, revêtu d'une pubescence grise ou jaune dense entremêlée sur l'avant corps, le pygidium et le dessous, élytres en partie subdénudés, en partie ornés de macules allongées blanches. Tête assez longue, carénée entre les yeux, ceux-ci moyens, noirs, antennes courtes, épaissies à l'extrémité; prothorax obconique, très rétréci et un peu étranglé en avant, impressionné sur les côtés en arrière, à lobe médian faiblement échanéré au sommet et subsilloné en dessus; écusson entaillé au sommet; élytres un peu plus larges que le prothorax, faiblement élargis au milieu, un peu rétrécis et séparément arrondis au sommet, déprimés vers la suture, striés; pygidium grand; cuisses postérieures allongées, inermes, faiblement creusées en dessous. Long. 4 mill.

Voisin de *B. mimus* GYLH. = *senegalensis* PIC, mais très distinct par sa coloration générale testacée et son dessin élytral sans macules noires.

*Bruchus cavithorax* n. sp.

Modice elongatus, subopacus, pro parte griseo aut fulvo pubescens, niger, variabiliter rufo notatis, antennis ad basin pedibusque plus minusve testaceis.

**Habitat:** Windhuk; dans des cosses de gousses de l'acacia sauvage.

Modérément allongé, courtement rétréci aux deux extrémités, subopaque, en partie revêtu d'une pubescence grise ou jaunâtre, noir avec le dessous du corps en partie et variablement marqué de roux, de même quelquefois le disque, ou les côtés des élytres, base des antennes et pattes plus ou moins testacées. Tête longue, yeux noirs; antennes courtes, épaissies à l'extrémité, testacées au moins à la base; prothorax court et transversal, subarqué en avant, marqué d'une forte impression sur le disque, fortement ponctuée, à lobe postérieure large et tronqué, écusson carré; élytres peu plus larges que le prothorax, subarqués sur les côtés, séparément arrondis au sommet, un peu déprimés sur la suture et tuberculés à la base, finement striés, d'ordinaire avec de petites macules blanches détachées de la pubescence foncière en partie fauve; pygidium grand, plus ou moins rougeâtre, mais noir sur le milieu; pattes plus ou moins testacées, les postérieures parfois foncées, cuisses postérieures épaissies mais inermes. Long. 5—5,3 mill.

Cette espèce, facile à reconnaître par la structure de son prothorax qui offre une forte impression discale, jointe à sa coloration, peut prendre place près de *B. submaculatus* FÄHR.

*Bruchus mimus* Gyll. (= *senegalensis* Pic).

**Habitat:** Tsumeb; Dr. W. MICHAELSEN, 13.—19. VII. 1911. (1 Ex.).

*Caryoborus interstinctus* Fähr.

**Habitat:** Karibib; Dr. W. MICHAELSEN, 23.—26. IV. 1911.

*Spermophagus capensis* Motsch.

**Habitat:** Ferme Okosongomingo aux pied du „Kleiner Waterberg“; H. THOMSEN, VII.—VIII. 1912.

*Spermophagus natalensis* Fähr.

Sans indication de localité; Landesmuseum Windhuk.

---