

LANIOTURDUS

SWA/NAMIBIA VOGELKLUB
eine Zweigstelle der
SWA Wissenschaftlichen Gesellschaft
und der
Southern African Ornithological
Society

Newsletter of the SWA/Namibia Bird Club
Mitteilungen des SWA/Namibia Vogelklubs
Vol./Jg. 22, No. 3 1986

CONTENTS

INHALTSANGABE

Beiträge bitte an den Redakteur des LANIOTURDUS p.A. SWA Wissenschaftliche Gesellschaft, Postfach 67, Windhoek, 9000 senden.

Mitgliedsbeiträge für die S.A.O.S. und die Wissenschaftliche Gesellschaft für 1986 sind wie folgt:

Mitgliedschaft SWA Wissenschaftliche Gesellschaft und
SWA/Namibia Vogelklub R 25-00 pro Jahr

Mitgliedschaft SWA Wissenschaftliche Gesellschaft und
der Southern African Ornithological Society R 26-00 pro Jahr

Als ein Ordentliches Mitglied von sowohl der S.A.O.S. als auch der SWA Wissenschaftlichen Gesellschaft, erhalten Sie die populärwissenschaftliche Zeitschrift BOKMAKIERIE, das wissenschaftlich ausgerichtete Journal OSTRICH und ebenfalls die lokalen Mitteilungen LANIOTURDUS, weiteres Informationsmaterial und die allgemeinen Publikationen der SWA Wissenschaftlichen Gesellschaft.

Als Ortsgruppen-Mitglied des SWA/Namibianischen Vogelklubs stehen Ihnen der LANIOTURDUS, sowie die Mitteilungen und zusätzliche Informationen der SWA Wissenschaftlichen Gesellschaft zu.

Bemerkungen an Mitarbeiter:

Manuskripte sollten mit Schreibmaschine (oder in gut leserlicher Handschrift) geschrieben sein und zwar mit doppeltem Zeilenabstand auf A4 (30 x 21 cm) Format.

Skizzen, Karten und Tabellen sollten auf weissem Qualitätspapier mit schwarzer Tinte gezeichnet werden.


Klare Schwarz-weiss-Photographien (15 x 20 cm) können eingereicht werden, um die Arbeit zu illustrieren.

EDITORIAL/ REDAKTION.....	46
ARTICLES & REPORTS/ ARTIKEL & BERICHTE :	
Is the Whitetailed Shrike a terrestrial batis?	47
PARK NOTES/ BERICHTE :	
African Skimmers breeding in the Okavango River.....	53
Burying of excess food by Black Crows.....	55
NOTES & NEWS/ BEMERKUNGEN & MITTEILUNGEN	55
HEADSCRATCHERS...ZUM KOPFZERBRECHEN	61
MYSTERY BIRD...WAS FÜR EIN VOGEL IST DAS ?.....	61
NOTICES	62
RECENT LITERATURE...NEUERSCHEINUNGEN	63
PROJECTS...REQUESTS.....	64

Printed by John Meinert (Pty) Ltd.

1. "CREATIONISM"

(continued on page 52 ...)



"Seit langer Zeit mal wieder einige Kurzmeldungen für den Lanioturdus : Am Sonntag, dem 15. Juni, rief mich ein Bekannter an; ein sonderbarer Vogel habe sich bei dem Futterplatz auf seinem Hofe eingefunden. Als ich ankam, war der Vogel noch da. Es war ein männlicher Grautoko *Tockus nasutus*. Wir versuchten, ihn mit rohen Fleisch- und Apfelstückchen zu füttern, aber vergeblich. Als wir ihm zu aufdringlich wurden, flog er auf und davon.

Der 22. Juni war sonnig, warm und windstill - Ostwindstimmung. Ich sass auf der Veranda des Yachtclubs und genoss ein Bier, als ein Schwarm Rotzügelmausvogel *Colius indicus* sich auf dem Maschendrahtzaun, der Hafen- und Yachtclubgelände trennt, niederliess und von dort zur Steinschüttung niederturnte. Es war noch Ebbe, und die Mausvögel krochen emsig zwischen den mit Grünalgen bewachsenen Steinen umher und frasssen Grünalgen. Ob sie auch gleichzeitig von den zahllosen kleinen Fliegen und Spinnen erbeuteten, konnte ich leider nicht erkennen. Ein sonderbares Verhalten für Mausvögel - eine erstaunliche Anpassung, vom Baumbewohner zum Strandläufer.

Am 13.-14.-15. September konnte ich wieder bei Lüderitzbucht Kapuhus *Bubo capensis* beobachten, dieses mal an zwei getrennten Stellen. Ein Nest mit Eiern oder Küken fand ich aber nicht, dafür in der Nachbarschlucht eines des Turmfalken *Falco tinnunculus* mit drei Eiern.

Am 18. Oktober dieses Jahres sah ich zum ersten Mal in einem Park im Stadtgebiet einen Sichelhopf *Phoeniculus cyanomelas*. Der Vogel konnte ca. 15 Minuten beobachtet werden. Bei Nachfragen in der Nachbarschaft des Parks wurde mir bestätigt, dass seit etwa drei Wochen mehrere Sichelhopfe in dem Park anwesend seien und auch die umliegenden Gärten besuchen. Ob sie sich hier permanent niederlassen werden?

Ein Paar Schwalbenschwanz-Bienenfresser *Merops hirundineus* soll sich in der gleichen Gegend aufhalten, was ich aber bisher nicht bestätigen konnte.

Russnektravögel *Nectarinia fusca* waren jahrelang zahlreich im Stadtgebiet und brüteten hier auch, meist im Juni. Noch letztes Jahr wurde ein Junges bei mir im Hofe flügge. Seit Anfang März dieses Jahres sah ich nicht einen einzigen Vogel mehr. Es ist anzunehmen, dass sie sich in das Kuisebdelta verzogen haben, das wieder voller blühender *Nicotiana glauca* steht."

A. WALTER, Postfach 577, Walvis Bay.

----oo00oo----

EINSENDESCHLUSS DER ARTIKEL FÜR DIE NÄCHSTE AUSGABE DES LANIOTURDUS IST DER 10 FEBRUAR 1986.

DEADLINE FOR SUBMISSION OF ARTICLES FOR THE NEXT ISSUE OF LANIOTURDUS IS 10 FEBRUARY 1986.

LONG DISTANCE RECOVERIES OF RINGED BIRDS

Subantarctic birds

Possession Island, one of the French-owned Crozet Islands, lies in the Subantarctic waters of the southern Indian Ocean, some 1 000 km east of Marion Island. The straight line distance between the Crozet Islands and the Namib coast is roughly 5 000 km. Two birds caught and ringed on Possession Island have been recovered along the Namib coast this year.

The first recovery, in May, merely comprised a ring found on the Palgrave beach by Mr Miller of Walvis Bay. The ring proved to be from a Subantarctic Skua *Catharacta antarctica* which had been ringed as a nestling in January 1982.

In July I kicked over the dried-out carcass of a giant petrel on a beach on Halifax Island (off the coast at Lüderitz). Only one leg remained, but this leg had a French ring! This bird, a Northern Giant Petrel *Macronectes halli*, had been ringed almost eleven years ago, in "final plumage"; i.e., at least older than an obvious juvenile.

In September 1977 twenty-five giant petrels, including both Northern and Southern Giant Petrels *M. giganteus*, were caught at sea south of Lüderitz. They were "lassoed" with a hoop net, since after feeding on seal carcasses at the Long Islands, they were too heavy to take off easily from the water (Voisin et al. 1977 Cormorant 3:19-20). One of these petrels had been ringed as a juvenile at Macquarie Island south of eastern Australia. The remaining petrels were ringed and released. Subsequently, one petrel was recovered dead on a beach in New Zealand. In October 1986 one petrel was 'controlled' (ring checked and left on the bird) whilst breeding on Marion Island. Both petrel species occur regularly along the Namib coast and can occasionally be seen from the shore, but are not often reported. However, few bird species can give a better rate and range of recoveries!

Birds ringed in Europe

Two birds ringed in Europe have been found dead in SWA/Namibia in 1986. A European Swallow *Hirundo rustica* ringed in September 1985 at Wilga, Poland, was recovered on a farm near Grootfontein in February. This bird travelled a minimum distance of 8 000 km. A Sandwich Tern *Sterna sandvicensis*, ringed as a nestling at Hompervoet in the Netherlands in June 1983, was found dead at a roost in Sandwich Harbour in February 1986.

A.J. WILLIAMS, c/o Directorate of Nature Conservation,
Private Bag 13306, Windhoek.

A flock of Grey Louries *Corythaixoides concolor* is frequently seen foraging in the Klein Windhoek riverbed. In August a well-developed Grey Lourie nestling (not quite able to fly) was found in a gutter not far from the riverbed. The lourie was undamaged.

The lourie was kept indoors for four days, and started self-feeding on the third day, taking an assortment of fruit, mealworms and 'Seringa' berries (Persian Lilac *Melia azedarach*). On the third and fourth days the bird called intermittently.

On day five an adult lourie was seen perched in the garden. The young lourie was transferred to an outside aviary the next day, and within a short while a flock of six adult louries flew into the garden. These birds called loudly and frequently, and occasionally perched on top of the aviary.

Two days later I released the young lourie on top of the aviary. All the adult birds immediately flew down onto the aviary and crowded around the youngster, calling loudly. The adults then flew into a nearby *Prosopis* sp. tree, followed closely by the young lourie, which, not flying properly yet, half hopped, half flew and clambered into the tree. The entire flock of louries remained in the garden for about ten days, feeding on Seringa berries and additional fruit put out for them. The young bird was seen feeding itself and occasionally begging food from adults. The flock eventually disappeared, occasionally returning to feed early in the morning.

E.J. MYER, P.O. Box 11232, Klein Windhoek.

* * * * *

DO YOU NEED TO GIVE SOMEONE A BELATED XMAS PRESENT ??

Give him/her an attractive leather cover for a bird book...

Hand-made Genuine Leather covers for Roberts and Newmans are available at only R 16.00 each from the Wildlife Society, Namib Centre, P.O. Box 483, Swakopmund.

Please specify whether you want the cover(s) for Roberts and/or Newmans with or without handles, and what lettering you require on the cover (at no extra charge!).

A part of the cost of the cover(s) will be donated to the Wildlife Society Rhino Fund.

-----oo00oo-----

For Sale: Back-issues of LANIOTURDUS

The Bird Club is selling back-issues of LANIOTURDUS while supplies last. If you are interested, please contact Almuth at (061) 22 5372.

Headscratchers

Zum Kopfzerbrechen

A headscratcher at last! Mr A. Walter (P.O. Box 577, Walvis Bay) has the following query:

Recently I camped in the Cuah River, next to the fence of the Namib-Naukluft Park. There was open water upstream, and likewise some open water about six kilometres downstream, with lush vegetation. Despite this, birdlife was pretty poor in the region, with only a few species present, such as, for example, the Mountain Chat *Oenanthe monticola*. So I thought. Then I looked a little closer - The Mountain Chat I saw did not have a white rump and white under tail-coverts; in fact, the tail appeared entirely black. Furthermore, the bird had a white cap and white shoulder-patches. All these features fit Arnot's Chat *Thamnolaea arnoti* perfectly, except that this species is not supposed to occur in this area - who can help?

Mystery Bird

Was für ein Vogel ist das?

