



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-akademiens forhandlingar.

Stockholm :P. A. Norstedt & Söner,

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/15534>

arg. 12 (1855): <https://www.biodiversitylibrary.org/item/54201>

Page(s): Page 213, Page 214

Holding Institution: Natural History Museum Library, London

Sponsored by: Natural History Museum Library, London

Generated 30 November 2017 9:18 AM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/072185500054201>

This page intentionally left blank.

7. *Nya fogelarter från Damara-landet i södra Afrika.* — I ofvanstående bref hade Herr J. A WAHLBERG meddelat följande beskrifningar öfver sju såsom nya ansedda fogelarter:

Alauda grayi mihi. Griseo-isabellina (immaculata), subtus cum fronte lorisque albida. Latera juguli fusco-maculata. Remiges pallide fuscae limbis externis isabellinis (1:a & 2:a exceptis); 1—6 apicem versus saturatiores; 7 et seqq. apicibus subcordatis, albidis. Rectrices 2 intermediæ isabellinæ; laterales nigro-fuscae, basi, margine exteriori apiceque albidæ. Rem. 1:a spuria; 2—5 fere æquales.

♂ Rostr. a fr. 13,5 millim.; alt. rostri ante nares 5; ala 84; cauda 50; Tars. 21; dig. med. c. ungue 15,5; pollex c. u. 14,5.

♀ R. a. fr. 12 m.m.; alt. rostri ante nares 4; ala 78; cauda 50; Tars. 20; dig. med. c. u. 15; poll. c. u. 12.

Hab. in desertis arenosis inter flumina *Kuisip* et *Svakop* terræ Damararum.

Eremomela damarensis mh. superne cinereo-olivacea, auchenio capiteque superne et in lateribus cinereis, vertice olivaceo tincto, stria supra-oculari vix ulla. Subtus alba, crisso dilute sulphureo. Cauda rotundata! (Rectr. ext. 9 m.m. intermediâ brevior), fusca, olivaceo tincta. Tectrices alarum inferiores albæ. Remiges fuscae, extus olivaceo limbatae; 1:a brevis ($= \frac{1}{2}$ 2:dæ); 2=7, 3, 4 & 5 æquales, longissimæ. Rostrum corneum (in vivo), nigricans (in sicco). Pedes fusci. Iris læte flava. Femina similis mari sed major et magis olivaceo tincta.

♂ long. tot. 110. Exp. alar 152. R.a.fr. 8. ala 51. cauda 44. Tars. 15.

♀ — 112 — 160 — 8,5 — 52 — 47 — 15,5.

Hab. ad flumen *Svakop* terræ Damararum.

Erithacus schlegelii mh. Cinerea subtus dilutior (fere albida), in ventre sensim alba. Regio auricularis parum infuscata. Uropygium, tectrices caudæ superiores et inferiores, pogonia externa rectricum lateralium, basin versus, et tectrices alarum inferiores alba. Cauda de cet. nigra, vix emarginata. Remiges primariæ nigro-fuscae, 3—6 extus vix emarginatae; 2da intus, apicem versus, valde emarginata. Remiges secundariæ et tertiariæ tectricesque alar. superiores majores fusco-cinereæ, extus et apice albido-limbatae. Iris fusca. Rostrum et pedes nigri. — Long. totalis 168; Exp. alar. 291; R. fr. 13; alt. ad nar. 3,5; ala 93; C. 67; T. 28. — Hab. Damara-Land.

Saxicola albicans mh. albido-grisescens (immaculata), gastræo, uropygio, tectricibusque caudæ albidis. Cauda albida apice fusca. Remiges dilute fuscescentes, extus intusque albido limbatae. Rostrum et pedes nigri. Iris fusca.

♂ R.fr. 15; Ala 90; C. 52; T. 30,5; poll. c. u. 15; long. tot. 161; exp. alar 285.

♀ — » — 89 — 49 — » — 16 — 159 — 280.

In locis arenosis terræ Damararum, plerumque in fruticibus parvis insidens, vel in terra, fere semper per paria, vivit.

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh., d. 18 April 1855.

Platystira affinis mh. simillima *Platyst. pririt*, differt vero magnitudine et pictura feminæ. Caput superne et dorsum anterius cinerea (dorsum, in mare, ex parte obtecte nigrum), macula nuchali, minime definita, albida (in ♂ ochracea). Ala nigra, tænia longitudinali lata, margineque exteriori albis. Tænia lata e naribus ad nucham cærulescenti-nigra. Tectrices caudæ superiores rectricesque nigræ; extima pogonio externo (basi excepto) apiceque albis. Uropygium album, in mare nigro-, in femina cinereo-immixtum. Iris flava. Rostrum et pedes nigri.

♂ subtus albus, fascia jugulari lata, cærulescente-nigra (14 m.m.); stria alba e naribus inter colorem cinereum et nigrum.

♀ ventre epigastrioque medio albis; lateribus epigastrii, pectore, gutture lateribusque colli (fere circa nucham) ochraceis, gula dilutiore; Stria e naribus dilute ochracea.

♂ R. a. fr. 11. Ala 57. Cauda 44. Tars. 18,5.

♀ — 11,3 — 57 — 44 — 18,5.

In Mimosis terræ Damararum.

Graculus neglectus mh. Virescenti-niger, dorso ænescente, cinereo-fusco, plumis anguste (1, 1½ m.m.) virescenti-nigro limbatis, apice rotundatis (in adultis) vel parum acuminatis (in junioribus). Gula vix nuda, angulus enim plumatus sub nares usque extensus. Latera capitis plumosa. Annulus circa oculos nudus (2 m.m. latus), nigricans. Rectrices 12. Iris, in adultis ochracea, dimidio inferiore viridi; in junioribus tota cinereo-fusca. Rostrum nigricanti-corneum. Pedes nigri.

♂ Long. tot. 715; Exp. alar 1160; R. a. fr. 60, alt baseos 13,5; Ala 273; Cauda 130—138; Tars. 55; Dig. m. c. u. 82.

♀ R. a. fr. 56; Altit. 13; Ala 269; C. 137; T. 55.

Ad insulas oræ occidentalis Africæ meridionalis, ut Possession, Halifax, Ichaboe &c. sat frequens.

Graculus coronatus mh. Piscatorum capensium "*Kron-Duyker*." Crista frontalis inter oculos erigenda, plumis nonnullis, 25—35 m.m. longis composita. Latera frontis, supercilia & lora quasi tumida, carnea, plumis squamiformibus, rudimentariis prædita; margo ocularis inferior, angulus oris, gula nuda, et maxima pars maxillæ inferioris aurantia. Maxilla superior cornea. Iris læte rubra. Pedes nigri. — Niger, tectricibus alarum & scapularibus cinereis. Plumis apice (3—5 m.m. lat.) nigris, nigroque tenue limbatis, obtusiusculis. Rectrices 12. Angulus plumatus gulæ nudæ sub oculis desinens, nec ante illos extensus.

♂ Long. tot. 560. Exp. alar. 825. R. a fr. 30. Alt. ibid. 11. Ala 210. C. 130. Tars. 36. dig. med. c. u. 62.

♀ Long. tot. 540. R. a fr. 28. Alt. ibid. 10,5. Ala 208. C. 133. Tars. 35. dig. med. c. u. 60.

Ad insulas Possession &c. sat frequens. Nidus in scopulis, non multo substramine, fuce constat. Ovum 1 album.