


Lanioturdus torquatus  
Drosselwürger

MITTEILUNGEN  
**ORNITHOLOGISCHE  
ARBEITSGRUPPE**



SCHRIFTFLEITUNG: POSTFACH 67, WINDHOEK, S.W.A.

NO. 6/7

8. JAHRGANG

SEPTEMBER/OKTOBER 1972

# Herrn Heinrich von Maltzahn,

Farm Sissekab, Bez. Otavi,

Ehrenmitglied

der S.W.A. Wissenschaftlichen Gesellschaft,

Gründer der Ornithologischen Arbeitsgruppe,

in Ehrung und Anerkennung seiner Verdienste um die

wissenschaftliche Forschung

in Südwestafrika

anlässlich der Vollendung des 85. Lebensjahres

im Auftrag des Vorstandes als

## Urkunde

ausgestellt und überreicht.

Windhoek, S.W.A.

7. Oktober 1972

Präsident:

Sekretär:

Auf Hüttenhof wurden dem Ehepaar die Toechter Ilse und Hilda geboren; auf Sissekab kam ihr Sohn Fritz Heinrich zur Welt. Spaeter wurde die Haelfte der Farm Klein Ottlau hinzugekauft, auf der mein Vater seitdem lebt.

Er war zehn Jahre Vorsitzender des Farmervereins jener Gegend und fuenf Jahre Mitglied im Molkeirat und als Direktor der Rietfonteiner Molkerei taetig. 1963 flog er das einzige und letzte Mal nur fuer einen Monat nach Deutschland.

Neben seinem Beruf war seine Lieblingsbeschaeftigung die Ornithologie; und vor zehn Jahren wurde er der Gruender der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft der S.W.A. Wissenschaftlichen Gesellschaft

### ORNITHOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN WAEREND EINES BESUCHES

IN DER ETOSCH-PFANNE VOM 30.7. - 9.8.1972

Gewidmet Herrn H.von Maltzahn zum 85. Geburtstag  
von Peter Becker, Hildesheim.

Vom 23.7. bis zum 29.8.1972 besuchte ich zusammen mit meiner Frau Suedwestafrika. Wie bei meinem ersten Besuch in den Jahren 1964/65 wurden wir wieder ganz herzlich von unseren alten Freunden aufgenommen. Besonders danke ich Herrn H. Kolberg und Herrn H.v. Schwind, bei denen wir im Kreise ihrer Familien und auf gemeinsamen Exkursionen viele schoene Stunden erlebten. Herr Dr. Rust stellte uns freundlicherweise den VW-Bus der SWA Wissenschaftlichen Gesellschaft zur Verfuegung. So hatten wir die Moeglichkeit, mehrere Tage in die Etoschpanne zu fahren, um dort Wild und Voegel zu beobachten.

Die Pfanne selbst war voellig trocken, und auch die meisten Wasserstellen am Rande der Pfanne hatten kaum Wasser. Die weiter von der Pfanne entfernt liegenden Wasserstellen wurden daher von Wild und Voegeln stark besucht. Mehrere Stunden Ansitz ergaben meist eine beachtliche Liste von Vogelarten und -zahlen, sowie viele interessante Wildbeobachtungen.

Wetter: Taeglich strahlender Sonnenschein ohne eine Wolke am Himmel!  
Mittags bei Windstille sehr warm, nachts klar und kuehl,  
8 - 10°C.

Optische Ausruestung: Fernglas 10x50, Teleobjektiv 400 mm Novoflex.

#### Fahrtverlauf

- 29.7.72 Abfahrt von Windhoek, Uebernachtung auf Farm Gembok bei Otjiwarongo. Frau Goldbeck nahm uns freundlicherweise auf.
- 30.7.72 Otjiwarongo - Outjo - Etoschpanne, Ankunft Okaukuejo 17 Uhr.
- 31.7.72 Okaukuejo-Leobrunn-Grünewald-Natco-Adamax-Okondeka-Wolfnes-Okaukuejo.
- 1.8.72 Okaukuejo-Kapupuhedi-Ondongab-Aus-Olifantsbad-Gembokflakte-Gaseb ; Okaukuejo.

- 2.8.72 Okaukuejo-Leobrunn-Okaukuejo-Olifantsbad-Okaukuejo.  
 3.8.72. Okaukuejo-Homob-Salvadora-Rietfontein-Halali.  
 4.8.72 Halali-Helio-Goas-Nuamses-Etosha-Springbokfontein-  
 Batia-Goas-Helio-Halali.  
 5.8.72 Halali-Etosha-Kalkheuwel-Ngobib-Goas-Halali.  
 6.8.72 Halali-Helio-Goas-Kalkheuwel-Chudob-Namutoni- Klein Na-  
 mutoni - Namutoni.  
 7.8.72. Namutoni-KleinNamutoni-Kleinund Gross Okevi-Aroe-Twee Palms-  
 Namutoni.  
 8.8.72 Namutoni-Twee Palms-Aroe-Klein und Gross Okevi- Klein Na-  
 mutoni-Namutoni.  
 9.8.72 Namutoni verliessen wir gegen 9 Uhr in Richtung Tsumeb.

Liste der beobachteten Vogelarten

Strauss (*Struthio camelus*) R 1

Einzelne oder Paare waren an mehreren Stellen zu sehen. Am 8.8. beobachteten wir 18 ausgewachsene Strausse in lockerem Verband in "Fischers Pan" bei Namutoni.

Zwergtaucher (*Podiceps ruficollis*) R 6

1-3 Exemplare beobachteten wir an den Wasserstellen Goas, Rietfontein und Klein Namutoni. Ausser einem Exemplar in Rietfontein befanden sich alle im Schlichtkleid.

Schwarzkopfreiherr (*Ardea melanocephala*) R 55

Am 8.8. sahen wir in der Naehc der Wasserstelle Twee Palms 1 Exemplar auf voellig trockenem Gelaende unter Bueschen im Gras nach Nahrung suchen.

Marabu (*Leptoptilos crumeniferus*) R 73

Ueber Twee Palms kreiste am 8.8. ein Vogel.

Nilgans (*Alopochen aegyptiacus*) R 89

Fast an jeder Wasserstelle ein Paar! In Klein Namutoni bruetete ein Paar auf den Baeumen inmitten der Wasserstelle.

Rotschnabelente (*Anas erythrorhyncha*) R 97

Nur ein Exemplar am 8.8. an der Wasserstelle Twee Palms festgestellt.

Sekretär (*Sagittarius serpentarius*) R 105

Einzelexemplare an mehreren Stellen beobachtet. Er jagte besonders gern in der Grassteppen-Zone zwischen der Pfanne und dem Buschland. Siehe auch unter Singhabicht!

Kapgeier (*Gyps coprotheres*) R 106

12 Exemplare am 5.8. ueber Kalkheuwel, 6.8. 6 Exemplare ueber Goas und 1 Exemplar bei Chudob kreisend.

Weissrückengeier (Gyps africanus) R 107

Am 5.8 5 Exemplare unter Kapgeiern kreisend (bei Kalkheuwei).

Ohrengeier (Torgos tracheliotus) R 108

Westlich von Okaukuejo kreisten am 31.7. 2 Exemplare.

Mönchsgeier (Necrosyrtes monachus) R 110

Auf dem Wege von Okaukuejo nach Salvadora sahen wir morgens neben der Pad 2 Exemplare auf einer grossen Akazie sitzen.

Lanner (Falco biarmicus) R 114

Am Morgen des 2.8. jagte 1 Exemplar an der Wasserstelle Leobrunn.

Rothalsfalke (Falco chicquera) R 117

1 Exemplar an der Wasserstelle Sueda am 3.8. Offenbar bruetet der Falke in einem der Baeume. Von Autos vertrieben, kehrte der Vogel immer wieder in einen Baum zurück, in dem sich ein Horst befand.

Turmfalke (Falco tinnunculus) R 125

4 Einzelbeobachtungen im gesamten Gebiet.

Zwergfalke (Poliohierax semitorquatus) R 126

Am 31.7. beobachteten wir 4 Exemplare nahe am Weg zwischen Okaukuejo und Leobrunn.

Raubadler (Aquila rapax) R 134

Einzelvoegel am Olifantsbad, KleinOkevi, Leobrunn und Goas.

Wahlbergs Adler (Aquila wahlbergi) R 137

Auch diesen Adler sahen wir mehrmals in Einzelexemplaren, am Olifantsbad am 2.8. 2 Exemplare.

Afr. Habichtsadler (Hieraaëtus spilogaster) R 141

Ueber Goas kreiste am 5.8. 1 Exemplar.

Kampfadler (Polemaëtus bellicosus) R 142

Ein juengeres Exemplar hielt sich am 31.7. mehrere Stunden in Leobrunn auf.

Schwarzbrustschlangennadler (Circaëtus pectoralis) R 146

Am 5.8. kreiste ein Exemplar mit Beute ueber der Pad zwischen Etosha und Kalkheuwei.

Gaukler (Terathopius ecaudatus) R 151

Diesen bunten Greif sahen wir als Einzelvoegel an ca. 20 Wasserstellen. Nur einmal waren 2 Exemplare zusammen und unter allen nur ein unausgefaerbtes Exemplar.

Gebändeter Habicht (Accipiter tadius) R 161

Ein Altvoegel jagte am 8.8. an der Wasserstelle Kl. Okevi.

Gabarhabicht (Micronisus gabar) R 162

Diesen flinken Buschjaeger konnten wir an fast jeder Wasserstelle beobachten, wo Buesche und Kleinvoegel vorhanden waren. Manchmal jagten mehrere Habichte an einer Wasserstelle. Einen voellig schwarzen Gabarhabicht sahen wir in Olifantsbad.

Singhabicht (*Meliörax musicus*) R 165

Neben der Pad konnten wir diesen Greif oelter beobachten. Nur einmal sahen wir einen unausgefaerbten Vogel. In drei Faellen konnten wir eine auffaellige Vergesellschaftung eines Singhabichts mit einem Sekretär feststellen. Der Singhabicht blieb immer in der Naehede des jagenden Sekretärs (Entfernung ca. 5-20m). Wurde die Entfernung groesser - der Sekretär lief im Grase weiter - folgte ihm der Singhabicht und baumte in unmittelbarer Naehede des Sekretärs wieder auf. Offenbar wartete der Singhabicht darauf, dass der durch das Gras laufende Sekretär Insekten oder Kleinvoegel aufscheuchte, um sich dann auf sie stuerzen zu koennen. Oder wollte er gar beim Sekretär schmarotzen? Dieses Verhalten kann nur durch weitere Beobachtungen besser gedeutet werden.

Rotschnabel-Frankolin (*Francolinus adspersus*) R 182

In Kl. Namutoni hielt sich eine Familie mit 5 grossen Jungen auf. Sie liefen fast stuedlich zum Wasser und passierten jedesmal zur Freude der Besucher laut rufend die Reihe der haltenden Autos.

Perlhuhn (*Numida meleagris*) R 192

Im Gelaende und an den Wasserstellen in grossen Trupps beobachtet (60-100 Ex.). Wenn sie sich dem Wasser naehern, machen sie sich durch lautes Rufen bemerkbar. Am Wasser gab es häufig Zänkereien.

Teichhuhn (*Gallinula chloropus*) R 210

1 Exemplar am 3.8. im Schilf bei Rietfontein.

Kammblesshuhn (*Fulica cristata*) R 212

Ein Paar mit 2 grossen aber nicht flueggen Jungen sahen wir in Rietfontein. Die Jungen wurden von den Altvögeln gefuettert.

Paradieskranich (*Tetrapteryx paradisea*) R 216

1.8. bei Okaukuejo 14 Ex., 3.8. bei Halali 15 Ex. (ad. u. immat Ex.)  
5.8. 3 Ex. bei Coas.

Riesentrappe (*Ardeotis kori*) R 217

Im Gebiet um Okaukuejo haeufig, meist paarweise. Auch im uebrigen Gebiet taeglich gesehen.

Rotschopftrappe (*Lophotis ruficrista*) R 224

1 Ex. beobachteten wir am 30.7. zwischen Ombika und Okaukuejo.

Gackeltrappe (*Afrotis afra*) R 225

Haeufig beobachtet, jedoch noch keine Balztaetigkeit.

Jacana (*Actophilornis africanus*) R 228

3.8. 1 Exemplar am Schilfrand an der Wasserstelle Rietfontein.

Kronenkiebitz (*Stephanibyx coronatus*) R 242

Paarweise und in kl. Gruppen auf trockenen Freiflaechen gut vertreten.

Waffenkiebitz (Hoplopterus armatus) R 245

Fast an jeder Wasserstelle ein Paar. In Kl. Namutoni ein Paar mit 2 pull., in Kl. Okevi ein Paar mit 2 ausgewachsenen flüggen Jungen.

Flussuferläufer (Actitis hypoleucos) R 258

1 Exemplar am 2.8. an der Wasserstelle Gemsbokvlakte.

Bruchwasserläufer (Tringa glareola) R 264

Den Nordländer sahen wir am 3.8. in Rietfontein (1 Ex.) und am 7.8. in Kl. Namutoni (2 Ex.). Jeweils an den folgenden Tagen waren die Voegel wieder verschwunden (Zug zum Sueden?).

Afrik. Rennvogel (Rhinoptilus africanus) R 278

An mehreren Stellen zwischen Halali und Namutoni beobachtet. Meist handelte es sich um kleine Gruppen von ad. und immat. Ex. (Familien?)

Namaflughuhn (Pterocles namaqua) R 307

Haeufigste Flughuhnart, die wir an allen Wasserstellen beobachten konnten. Manchmal waren 100 und mehr Voegel an der Traenke.

Nachtflughuhn (Pterocles bicinctus) R 310

Am Abend des 1.8. konnten wir an der Wasserstelle in Okaukuejo ueber 50 Ex. beobachten. Ein Pärchen sahen wir beim Sandbaden mitten auf der Pad bei Aroe.

Guineataube (Columba guinea) R 311

In Leobränn sahen wir am 31.7. ueber 50 Exemplare am Wasser.

Kaplachtaube (Streptopelia capicola) R 316

An jeder Wasserstelle beobachtet, manchmal hunderte von Voegeln.

Senegaltaube (Stigmatopelia senegalensis) R 317

Auch diese Taube war ueberall haeufig. Im Gebiet um Okaukuejo ueberwog zahlenmaessig die Kaplachtaube, um Namutoni dagegen die Senegaltaube.

Kaptäubchen (Oena capensis) R 318

Ueberall in geringer Zahl angetroffen.

Graulärmvogel (Corythaixoides concolor) R 339

Je 2 Ex. an den Wasserstellen Okaukuejo, Chudob und Kalkheuwel.

In Kl. Namutoni hielten sich ca. 40-50 Ex. auf.

Perlkauz (Glaucidium perlatum) R 365

Auf Imitation antwortete an vielen Wasserstellen dieser Kauz sofort, oft 2-3 Exemplare!

Kapsegler (Apus barbatus) R 380

8.8. 1 Exemplar bei Twee Palms kreisend.

Palmensegler (Cypsiurus parvus) R 387

Namutoni und Twee Palms ca. 50 Ex.; 2 Ex. flogen am 5.8. ueber Kalkheuwel.

Schwalbenschwanzbienenfresser (Dicrocercus hirundineus) R 411

Insgesamt kamen ca. 30 Einzelexemplare zur Beobachtung.

Gabelracke (Coracias caudata) R 413

Von weitem ist dieser farbenpraechtige Vogel zu erkennen. Wir sahen ihn haeufig neben der Pad.

Strichelracke (Coracias naevia) R 415

Seltener als vorige Art, insgesamt nur achtmal beobachtet.

Afrik. Wiedehopf (Upupa africana) R 418

An 6 Wasserstellen festgestellt. Durch seinen Balzruf wurden wir auf ihn aufmerksam. Einmal flog ein Vogel vor uns ueber den Weg.

Grauer Toko (Tockus nasutus) R 424

5.8. 1 Exemplar bei Springbok fontein.

Kl. Rotschnabeltoko (Tockus erythrorhynchus) R 425

In kleinen und grossen Trupps konnten wir diese Art ueberall feststellen. Hoechstzahl am 6.8.: 49 Ex. bei Halali.

Gelbschnabeltoko (Tockus flavirostris) R 426

Nicht so haeufig wie vorige Art, aber in geringer Zahl an mehreren Stellen beobachtet.

Gr. Rotschnabeltoko (Tockus monteiri) R 429

Mehrmahl beobachtet, in der Haeufigkeit liegt er zwischen den beiden vorigen Arten.

Rotstirnbartvogel (Tricholaema leucomelan) R 432

Nur 1 Ex. am 4.8. zwischen Batia und Goas beobachtet.

Rotnackenlerche (Mirafrā africana) R 458

Mehrmals direkt am Rande der Pfanne festgestellt.

Sabotalerch (Mirafrā sabota) R 460

Paarweise und in kl. Trupps in freiem Gelaende beobachtet, meist am Rande der Pfanne.

Langschnabellerche (Certhilauda curvirostris) R 475

Am westlichen Rand der Pfanne zwischen Okaukuejo und Okandeka mehrmals beobachtet, meist paarweise.

Weisswangenlerche (Eremopterix leukotis) R 484

Zwischen Halali und Namutoni war diese Lerche haeufig in kleinen und groesseren Trupps anzutreffen.

Rotscheitellerche (Calandrella cinerea) R 488

Einzelbeobachtungen ueber das ganze Gebiet verstreut.

Gabelschwanzdrongo (Dicrurus adsimilis) R 517

Diese Art war ueberall anzutreffen, stellenweise haeufig.

Schildrabe (Corvus albus) R 522

Paarweise an vielen Wasserstellen beobachtet.

Kapkraehe (Corvus capensis) R 523

An der Wasserstelle Salvadorā und deren naeherer Umgebung sahen wir 7 Ex. in Gesellschaft von Schildrabē. Je 2 Ex. in Leobrunn u. Goas.

Kapmeise (Parus ater) R 525

Einen Trupp von 8 Ex. beobachteten wir in den Dornenbüschen zwischen Gembokvlakte und Gaseb.

Weisstirnbeutelmeise (Anthoscopus caroli) R 530

In der Kapmeisengruppe hielten sich 3 Ex. dieser Art auf. Offenbar ziehen solche gemischten Trupps von Wasserstelle zu Wasserstelle.

Elsterdrossling (Turdoides bicolor) R 536

2-3 umherstreifende Trupps von 5-12 Ex. konnte wir beobachten.

Nacktohrdrossling (Aethocichla gymnogyns) R 537

Eine Gesellschaft von ueber 20 Voegeln sahen wir am 4.8. bei Goas. Ein fluegger Jungvogel wurde staendig gefuettert. Am 5.8. sahen wir einen Schwarm von 10 Ex. bei Ngobib.

Masken-Bülbül (Pycnonotus nigricans) R 544

An allen Wasserstellen mehr oder weniger stark vertreten. Hoechstzahl 60 Ex. an einer Wasserstelle.

Akaziendrossel (Turdus litsipsirupa) R 557

4.8. 3 Ex. Hartebeesdraai singend; 2 Ex. bei Goas singend.

Ameisenschmärtzer (Myrmecocichla formicivora) R 575

Einige Ex.: Fischers Pan, Okerfontein und Ondongab.

Südafrik. Heckensänger (Erythropygia paena) R 586

Haeufig vor unserem Auto ueber die Pad fliegend.

Bindensänger (Camaroptera fasciolata) R 614

Mehrere singende Ex. bei Halali und Namutoni.

Kurzschwanzsylvieta (Sylvieta rufescens) R 621

Dreimal konnten wir diese Art beobachten: Goas, Namutoni, Kl. Okevi.

Graurücken-Camaroptera (Camaroptera brevicauda) R 628

Nur ein Ex. dieser Art konnten wir sicher bei Nuamses bestimmen.

Kalahari-Zistensänger (Cisticola aridula) R 630

Im kniehohen Grase am Rande der Pfanne mehrmals beobachtet.

Rotscheitelzistensänger (Cisticola chiniana) R 642

Dieser Zistensänger hielt sich mehr im offenen Buschgelände auf, wir beobachteten ihn taeglich.

Brustbandprinie (Prinia flavicans) R 650

Fast an jeder Wasserstelle hoerten wir ihre markante Stimme.

Weisensänger (Parisoma subcaeruleum) R 658

Nur in und um Namutoni festgestellt.

Marico-Drosselschnäpper (Bradornis maricuensis) R 661

Sowohl an den Wasserstellen als auch im trockenen Gelaende ueberall angetroffen, meist paarweise.

Spornpieper (Anthus novaeseelandiae) R 692

Da alle Pieperarten sehr schwer zu bestimmen sind, haben wir nur



die sicher erkannten Ex. notiert. Diese Art haben wir mehrmals am Rande des Weges gesehen.

Langschnabelpieper (Anthus similis) R 693

Nur zwei Beobachtungen von je 2 Voegeln zwischen Adamax und Konkodoka, sowie bei Chudob.

Vaalpieper (Anthus vaalensis) R 695

Auf der freien Flaechе bei Gembokvlakte hielten sich ca. 10 Ex. auf.

Rotbauchwürger (Laniarius atro-coccineus) R 711

Insgesamt wurden etwa 20 Einzelexemplare gesehen. Bei Goas sahen wir auf engem Raum 4 Ex.

Damaratschagra (Tschagra australis) R 714

4.8. 1 Ex. Wasserstelle Helio.

Brillenwürger (Prionops plumata) R 727

Ein Trupp von 8 Ex. hielt sich am 4.8. bei Nuamses auf.

Weisscheitelwürger (Eurocephalus anguitimens) R 730

Einzelexemplare an mehreren Stellen beobachtet. 3 Ex. am 8.8. bei Namutoni.

Brubru (Ninia afer) R 731

Seinen unverkennbaren Ruf hoerten wir an vier Wasserstellen.

Lappenstar (Creatophora cinerea) R 735

Am 6.8. sahen wir ein unausgefärbtes Ex. in Kl. Namutoni in Gesellschaft von Rotschulterglanzstaren.

Rotschulterglanzstar (Lamprocolius nitens) R 737

In mehr oder weniger grosser Anzahl an jeder Wasserstelle vertreten. Max. 300 Ex. in Nuamses.

Meves-Glanzstar (Lamprotornis mevesii) R 742

7. und 8.8. je ein Paar in Namutoni. 7.8. 4 Ex. in Kl. Okevi.

Bindennektarvogel (Cinnyris mariquensis) R 755

31.7.-1.8. Okaukuejo 7-8 Ex., weibliche und unausgefärbte Ex.

Weissbauchnektarvogel (Cinnyris talatala) R 763

2 Ex. hielten sich am 7.8. in Kl. Okevi auf.

Russnektarvogel (Cinnyris fuscus) R 764

In Okaukuejo beobachteten wir ca 10 ad. und immat. Ex.

Büffelweber (Bubalornis albirostris) R 779

Nur in Namutoni sahen wir mehrere Ex. und beobachteten sie an ihren Nestern.

Mahaliweber (Plocepasser mahali) R 780

Überall verstreut einige kleine Brutkolonien. An einigen Nestern wurde bereits gebaut.

Siedelweber (Philetairus socius) R 783

Um Okaukuejo sahen wir mehrere ihrer Riesennester. In der Kolonie

.bei Leobrunn herrschte reges Leben.

Haussperling (Passer domesticus) R 784

Nur in den Kamps beobachtet, in Namutoni haeufig.

Rotbrauner Sperling (Passer motitensis) R 785

Kleine Fluege von 5-20 Ex. beobachteten wir an den Wasserstellen bei Okaukuejo und Halali.

Graukopfsperling (Passer diffusus) R 787

An einigen Wasserstellen war diese Art häufig, an anderen fehlte sie.

Schnurbärtchen (Sporopipes squamifrons) R 789

Ueberall trafen wir kleine Gruppen an. An vielen Wasserstellen recht zahlreich.

Dotterweber (Ploceus velatus) R 803

Einzelne Ex. an wenigen Wasserstellen festgestellt.

Blutschnabelweber (Quelea quelea) R 805

Scharen von 50-1000 Ex. konnten wir an fast jeder Wasserstelle sehen. Eindrucksvoll war der allabendliche Einfall der Weber in das Rohr bei Namutoni. Bei Sonnenuntergang fielen mehrere Hunderttausend Voegel dort zum Schlafen ein.

Rotkopfmadine (Amadina erythrocephala) R 820

Auch diese Art trat scharenweise an vielen Wasserstellen auf.

Bunstastrild (Pytilia melba) R 830

Kleine Trupps von 3-10 Ex. sahen wir an den Traenken Goas, Nuam-  
ses und Ngobib.

Granatastrild (Granatina granatina) R 840

4 Ex. sahen wir an der Wasserstelle Goas.

Elfenastrild (Estrilda erythronotos) R 841

Flüge bis zu 40 Ex. in Rietfontein, Chudob, Goas und Kl. Okevi.

Angolagirlitz (Serinus atrogularis) R 860

An einigen Wasserstellen trafen wir kleine Trupps an.

Gelbbauchammer (Emberiza flaviventris) R 874

In der Naehe von Namutoni sahen wir am 8.8. 2 Ex.

Waehrend dieser Exkursion, die uns nicht nur unvergessliche Wilderlebnisse schenkte, konnten wir insgesamt 110 Vogelarten feststellen. Mehrere Pieper, Lerchen und Greifvoegel konnten wir nicht genau bestimmen, da die Beobachtungszeit zu kurz oder die Entfernung zu gross war. Ebenso war es uns unmoglich, irgendwelche Rassenunterschiede zu machen, da wir keinen Vogel in die Hand bekamen. Rueckblickend koennen wir sagen, dass wir eine interessante und erfolgreiche Exkursion erlebt haben.